

Æðaskurðlækningar

Aðgerð	Líklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsóknar
Aflimun á ganglim	A	Húðflóra, stafýlókókkar, sjaldan G neikv. stafir Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar á 8 klst fresti í þrjú skipti	Sárasýking	1+
Opin aðgerð á kviðar- og útlimaslagæðum	A	Húðflóra, stafýlókókkar Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar á 8 klst fresti í þrjú skipti	Sárasýking	1++
Fóðring á ósæðargúl	A	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar á 8 klst fresti í þrjú skipti		1+
Aðrar endovascular aðgerðir	D	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. einu sinni við innleiðslu svæfingar. Undantekning: Segaleysandi meðferð í gervíæð, þá gefið 3svar á 24 klst þar til segaleysandi meðferð hefur verið hætt		4
Mjúkvefjaaðgerð á hendi	✓	Íhuga gjöf varnandi sýklalyfja, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar í eitt skipti. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á æða- og bæklunaraðgerðum		1++
Æðaleggjaísetning án aðganga (tunnel)	D	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf		4
Æðaleggjaísetning með aðgöngum (tunnel)	A	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf		1++
Hreinar-mengaðar aðgerðir þegar engar sértækar rannsóknir liggja fyrir	D	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar		4
Ísetning á ítarhlut eða implanti þegar engar sértækar rannsóknir liggja fyrir	D	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar		4
Ef alvarlegt penicillin ofnæmi				
Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin 600mg i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti				
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing				