

Almennar skurðlækningar

Aðgerð	Liklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsóknna
Aðgerð á vélinda	D	Munn- og hálsflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g x 3 i.v. í allt að 48 klst., ráðlegging byggð á niðurstöðum rannsóknna á öðrum hreinum - menguðum aðgerðum.		4
Aðgerð á maga og skeifugörn án garnatengingar	A	G neikv. stafir, G jákv. kokkar Varnandi meðferð með sýklalyfjum er óþörf , nema aðrir áhættuþættir séu til staðar, þá cefazólín 1g x 1 i.v. (sýrulaus magi, skertar magahreyfingar, stífla, mikil offita).	Sárasýking	1+
Aðgerð á maga og skeifugörn með garnatengingu	A	G neikv. stafir, G jákv. kokkar Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. og metrónídazól 0,5g i.v. við innleiðslu svæfingar.	Sárasýking	1+
Aðgerð á smágirni	D	G neikv. stafir, loftfælur Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. og metrónídazól 0,5 g i.v. í allt að 24 klst.		4
Aðgerð á gallvegum	A	G neikv. stafir, G jákv. kokkar Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. x 1.	Sárasýking	1++
Aðgerð á brisi með garnatengingu	B	G neikv. stafir, G jákv. kokkar Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. x 1, ráðleggingin er byggð á niðurstöðum rannsóknna á gallvegaaðgerðum.	Sárasýking	1++
Aðgerð á brisi án garnatengingar	✓	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		
Aðgerð á lifur	B	G neikv. stafir, G jákv. kokkar Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. x 1, ráðleggingin er byggð á niðurstöðum rannsóknna á gallvegaaðgerðum.	Sárasýking	1++
Gallblöðrutaka opin aðgerð	A	G neikv. stafir, G jákv. kokkar Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. x 1.	Sárasýking	1++
Gallblöðrutaka gegnum kviðsjá	A	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, en kemur til álíta hjá sjúklingum í mikilli áhættu (gallvegamynd í aðgerð, gallleki í kviðarhol, breytt í opna aðgerð, gallblöðrubólga, brisbólga, gula, þungun, ónæmisbæling, ísetning íhlutar).		1+

Botnlangataka	A	G neikv. stafir, loftfælur	Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefúroxím 1,5g x 1 i.v. og metrónídazól 0,5g x 1 i.v. Meðferð í 24 klst. við drepi. Meðferð í 3-5 sólarhringa við sprungnum botnlanga.	Sárasýking, ígerð í kviðarholi	1++
Aðgerð á ristli og endaparmi	A	G neikv. stafir, loftfælur	Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefúroxím 1,5g x 1 i.v. og metrónídazól 0,5g x 1 i.v.	Sárasýking, ígerð í kviðarholi	1++
Nárvakiðslit m/án stoðnets	A		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		1++
Nárvakiðslit með kviðsjá m/án stoðnets	B		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum frá opnum aðgerðum á nárvakiðsliti.		1++
Opin kviðslitsaðgerð m/án stoðnets	C		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á opnum aðgerðum á nárvakiðsliti.		1++
Opin eða kviðsjáraðgerð með stoðneti t.d. gastric band eða rectopexy	B		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á opnum aðgerðum á nárvakiðsliti, en kemur til álita hjá sjúklingum í mikilli áhættu (sýrulaus magi, skertar magahreyfingar, stífla, mikil offita).		1++
Speglun	D		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		4
ERCP, PEG	D	G neikv. stafir, (loftfælur)	Íhuga skal varnandi sýklalyfjagjöf hjá sjúklingum í mikilli áhættu (pseudocysta, ónæmisbæling, lélegt gallflæði t.d. sclerosing cholangitis eða gallvegakrabbamein) þá cefúroxím 1,5g x 1 i.v. (og metrónídazól 0,5g i.v.).		4
Miltistaka	✓		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf. Íhuga á varnandi sýklalyfjagjöf hjá sjúklingum í mikilli áhættu (ónæmisbæling).		
Aðgerð á nýrnaheftum			Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		
Aðgerð vegna brjóstakrabbameins	A	Húðflóra	Íhuga varnandi sýklalyfjagjöf vegna frumaðgerðar hjá sjúklingum í sérstökum áhættuhópum, en mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf við enduraðgerðir. Cefazólín 1g i.v. í allt að 24 klst.		1++
Enduruppbygging brjóst	C	Húðflóra	Íhuga varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. í allt að 24 klst.	Sýkingar eftir 6 vikur	2+

Brjóstaaðgerð með ítarhlut uppbygging/fegrunaraðgerð	C	Húðflóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. í allt að 24 klst. ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á öðrum brjóstaaðgerðum og öðrum aðgerðum þar sem ítarhlut er komið fyrir.	1++
Lyfjabrunnur	A	Húðflóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. x 1.	Sýking 1++
Æðaleggjaísetning án aðganga (tunnel)	D		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.	4
Æðaleggjaísetning með aðgöngum (tunnel)	A		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.	1++
Ef alvarlegt penicillin ofnæmi				
Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin 600mg i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti				
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing				