

Augnaðgerðir					
Aðgerð	Liklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsóknar	
Aðgerð vegna drers	A	Húðflóra	Eindregið er mælt með gjöf varnandi sýklalyfja. Cefúroxím 1mg gefið í fremra augnhólf.	Innri augnknattarbólga	1++
Gláka eða hornhimnu ígræðsla	B	Húðflóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1mg gefið í fremra augnhólf ásamt levófloxacín augndropum		1+
Aðgerð á táragangi	C	Nef og kokflóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefúroxím 1,5g i.v. x 1	Sárasýking	2+
Opið augnslys	B	Húðflóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Gentamicín 40µg og klindamýsín 45µg gefið í glerhlaup augans.	Innri augnknattarbólga	1+
Ef alvarlegt penicillin ofnæmi					
Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti					
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing					