Brjóstholsskurðlækningar

Aðgerð		Líklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsókna
Gangráðsísetning	A	Stafýlókokkar, sjaldnar G neikv. stafir	**Mælt er með** varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g x1 i.v.	Sýking	1++
Bjargráðsísetning	√	Stafýlókokkar, húðflóra	**Mælt er með** varnandi sýklalyfjagjöf. Vankómýcín 1g x 2 i.v. í 48 klst.	Sýking	
Opin hjartaaðgerð	C	Húðflóra	**Mælt er með** varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g x 3 i.v. í 48 klst.	Sárasýking	2++
Lungnaaðgerðir	A	Húð- og e.t.v. munnflóra	**Mælt er með** varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g x 3 i.v. í 24 klst.	Sárasýking	1+

Ef alvarlegt penicillin ofnæmi

Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin 600mg i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing