

Lýtalækningar

Aðgerð	Liklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsóknar
Opin aðgerð m stífun á kjálka	A	Munn- og húðflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Klindamýcín 600mg i.v. x 1, ráðlögð meðferðarlengd ≤24 klst.	Sárasýking	1++
Beingrafi í munni	B	Munnflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Klindamýcín 600mg i.v. x 1, ráðlögð meðferðarlengd ≤24 klst.		1++
Bitstöðu aðgerð á kjálka	A	Munnflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Klindamýcín 600mg i.v. x 1, ráðlögð meðferðarlengd ≤24 klst.	Sárasýking	1+
Aðgerð á andliti (hrein)	✓	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		
Fegrunaraðgerð með ítarhlut	✓	Húðflóra Íhuga varnandi sýklalyfjagjöf, ráðlegging byggð á niðurstöðum rannsókna á öðrum aðgerðum þar sem ítarhlut er komið fyrir.		4
- Aðgerð á eyrum hrein/hrein-menguð	A	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		1++
- Aðgerð á nefi og afholum með/án speglunar	A	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		1+
Flókin aðgerð á miðsnesi og nefi með ígræðlingi	A	Nefflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Klindamýcín 600mg i.v. x 1, ráðlögð meðferðarlengd ≤24 klst.		1++
Hrein aðgerð góðkynja sjúkdómur	D	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.		4
Hrein aðgerð, illkynja sjúkdómur	C	Íhuga skal varnandi sýklalyfjameðferð.	Sárasýking	2+
Hrein eða hrein-menguð	A	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. x 1 við innleiðslu svæfingar.		1++
	C	Ráðlögð meðferðarlengd ≤24 klst.		2+
Skarð í vör og klofinn gómur	✓	Munnflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf við stærri inn grip á klofnum gómi. Klindamýcín, ráðlögð meðferðarlengd ≤24 klst.		
Aðgerð vegna brjóstakrabbameins	A	Húðflóra Íhuga varnandi sýklalyfjagjöf vegna frumaðgerðar hjá sjúklingum í sérstökum áhættuhópum, en mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf við enduraðgerðir. Cefazólín 1g i.v. í allt að 24 klst.		1++

Enduruppbygging brjósts	C	Húðflóra	Íhuga varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. í allt að 24 klst.	Sýkingar eftir 6 vikur	2+
Brjóstaaðgerð með ítarhlut uppbygging/fegrunaraðgerð	C	Húðflóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. í allt að 24 klst. ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á öðrum brjóstaaðgerðum og öðrum aðgerðum þar sem ítarhlut er komið fyrir.		1++
Aðgerð á opnu beinbroti	A	Húðflóra, stafýlókókkar, sjaldan G neikv. stafir	Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. eins fljótt og auðið er.	Sárasýking	1++
Aflimun á ganglim	A	Húðflóra, stafýlókókkar, sjaldan G neikv. stafir	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar.	Sárasýking	1+
Mjúkvefjaaðgerð á hendi	✓		Íhuga gjöf varnandi sýklalyfja, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á æða- og bæklunaraðgerðum.		1++
Hreinar-mengaðar aðgerðir þegar engar sértækar rannsóknir liggja fyrir	D		Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar.		4
Ísetning á ítarhlut eða implanti þegar engar sértækar rannsóknir liggja fyrir	D		Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar.		4
Ef alvarlegt penicillin ofnæmi					
Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti					
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing					