

Bæklunarlækningar

Aðgerð	Líklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsóknna
Aðgerð á hrygg með/án spengingar	A	Stafýlókókkar, húðflóra Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g x 1 i.v., en mest í 24 klst.	Sárasýking	1++
Liðskipti	B	Húðflóra, stafýlókókkar, sjaldan G neikv. stafir Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar, á 8 tíma fresti í allt að 24 klst., eða annað sýklalyf með sambærilega virkni gegn stafýlókókkum.	Mjaðmasýking Liðsýking	1++, 1+
	B	Mælt er með notkun á sýklalyfjasementi til viðbótar við i.v. sýklalyf		2++
Aðgerð á opnu beinbroti	A	Húðflóra, stafýlókókkar, sjaldan G neikv. stafir Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. eins fljótt og auðið er.	Sárasýking	1++
Opin aðgerð á lokuðu beinbroti	A	Húðflóra, stafýlókókkar Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar, á 8 tíma fresti í allt að 24 klst.	Djúp sárasýking	1++
Aðgerð á mjaðmabroti	A	Húðflóra, stafýlókókkar Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar á 8 tíma fresti í allt að 24 klst.	Djúp sárasýking	1++
Bæklunaraðgerð án ítarhlutar	D	Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á öðrum hreinum- menguðum aðgerðum		4
Aflimun á ganglim	A	Húðflóra, stafýlókókkar, sjaldan G neikv. stafir Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar.	Sárasýking	1+
Mjúkvefjaaðgerð á hendi	✓	Íhuga gjöf varnandi sýklalyfja, cefazólín 1g i.v. við innleiðslu svæfingar. Ráðleggingin byggir á niðurstöðum rannsókna á æða- og bæklunaraðgerðum		1++

Ef alvarlegt penicillin ofnæmi

Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin 600mg i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing