

Fæðing og kvensjúkdómar

Aðgerð	Líklegir sýkingavaldar	Ráðlegging	Rannsóknarviðmið	Gæðamat rannsókna
Legnám um kvið	A	Stafýlókokkar, blönduð flóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1 g x 1 i.v., en mest í 24 klst.	1++
Legnám um fæðingarveg m/án kviðsjár	A	Stafýlókokkar, blönduð flóra	Mælt er með varnandi sýklalyfjagjöf. Cefazólín 1 g x 1 i.v., en mest í 24 klst.	Sýking í grindarholi 1+
Keisaraskurður	A	Húðflóra	Eindregið er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf, cefazólín 2 g x 1 i.v. eftir að klemmt hefur verið fyrir naflastreng.	Sárasýking 1++
Fæðing með aðstoð (tangarfæðing, sogklukka)	A		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.	1++
Rífa á spöng í fæðingu	D	G neikv. stafir, loftfætur	Mælt er með sýklalyfjagjöf ef þriðju eða fjórðu gráðu spangarrífa, rof sem nær til endaparmshringvöðva eða í endaparmsslímhúð. Cefúroxím 1,5 g x 1 i.v. og metrónídazól 0,5 g x 1 i.v.	4
Losun á fylgju með hendi	D		Íhuga skal gjöf varnandi sýklalyfja.	4
Framkallað fósturlát	A		Íhuga skal gjöf varnandi sýklalyfja hjá sjúklingum í sérstakri sýkingarhættu t.d. sykursýki, mikil offita o.fl.	Sýking í efri hluta kynfæra 1++
Legtæming eftir fósturlát	A		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.	1++
Ísetning lykkju	A		Ekki er mælt með varnandi sýklalyfjagjöf.	1++

Ef alvarlegt penicillin ofnæmi

Við aðgerðir þar sem húðflóra er líklegur sýkingavaldur þá gefa klindamýcin i.v. á 6 klst fresti þar sem þörf er á fleiri en einum skammti
Við aðgerðir þar sem Gram neikvæðir stafir koma við sögu er ráðlagt að hafa samráð um lyfjaval við smitsjúkdómalækni eða sýklafræðing